



DIAGNOSTICA DR. TILOCCA S.r.l.
Laboratori Analisi Cliniche Riuniti
Spec. in Microbiologia/Genetica Medica/Patologia G
GELA: C/SO S. Aldisio, 264/268 (Sede Centrale)
TEL/FAX 0933-937699/824949
GELA: Via Europa, 61/63 Tel . 0933/834534

LICATA: Corso Roma, 42 Via S. Domenico, 5
Tel. 0922/1803109 Fax 0922/1924055
infoanalisihilocca@virgilio.it

ALDOSTERONE E RENINA IN CLINOSTATISMO

Nei 5 giorni che precedono il test il paziente (se possibile) deve seguire un'alimentazione contenente un normale contenuto di sodio e sospendere l'assunzione di farmaci ipotensivi. IL PAZIENTE DOVRA' RIMANERE DISTESO PER CIRCA TRE ORE, DOPO LE QUALI VERRA' EFFETTUATO IL PRELIEVO.

In alternativa, ove sia possibile, si può eseguire il prelievo la mattina al risveglio, prima che il paziente si sia alzato.

ALDOSTERONE E RENINA IN ORTOSTATISMO

Nei 5 giorni che precedono il test il paziente (se possibile) deve seguire un'alimentazione contenente un normale contenuto di sodio e sospendere l'assunzione di farmaci ipotensivi. IL PRELIEVO VERRA' ESEGUITO DOPO 2-3 ORE DI STAZIONE ERETTA O ALMENO 1 ORA DI DEAMBULAZIONE A PASSO VELOCE.

N.B.: *Si consiglia telefonare per appuntamento.*