



**DIAGNOSTICA DR. TILOCCA S.r.l.**  
Laboratori Analisi Cliniche Riuniti  
Spec. in Microbiologia/Genetica Medica/Patologia G  
GELA: C/SO S. Aldisio, 264/268 (Sede Centrale)  
TEL/FAX 0933-937699/824949

GELA: Via Europa, 61/63 Tel . 0933/834534

LICATA: Corso Roma, 42 Via S. Domenico, 5  
Tel. 0922/1803109 Fax 0922/1924055  
infoanalisihilocca@virgilio.it

### **SANGUE OCCULTO SENZA DIETA**

*Munirsi di un contenitore adatto disponibile nel nostro Laboratorio o acquistabile in sanatoria o farmacia.*

***Evacuare in un recipiente pulito**, raccogliere una piccola quantità di feci (grandezza di una nocciola) evitando di riempire completamente il contenitore.*

***Non raccogliere le feci durante il periodo mestruale ma almeno 3 giorni dopo, oppure in presenza di emorroidi sanguinanti o sangue nelle urine.***

*Evitare l'assunzione di Alcool, Aspirina o altri farmaci simili, che possono causare irritazioni gastrointestinali e provocare sanguinamento. Eventualmente sospendere l'assunzione almeno 1-2 giorni prima dell'esecuzione del test.*

*Raccogliere le feci da tre diverse evacuazioni successive, allo scopo di incrementare la probabilità di trovare il sangue da emissioni intermittenti o non omogenee.*